

Razpredelnica 1: Zahteve za semenske nasade

Kategorija	Predosnovno seme		Osnovno seme		Certificirano seme		
	IS	S 1, S 2	SE 1, SE 2	E	A	B	C
1. Pregled semenskega nasada	% rastlin						
a) Sortna čistost – rastline tujih sort:	0	0	0	0	0,01	0,05	0,1
b) Črna noga in mehka gniloba krompirjevih gomoljev (<i>Erwinia</i> spp)	0	0	0	0	0,03	0,1	0,1
c) Bela noga (<i>Thanatephorus cucumeris</i> = <i>Rhisoctonia solani</i>)	0	1	2	3	6	8	12
d) Druge bolezni venenj (<i>Colletotrichum coccodes</i> , <i>Verticilium albo-atrum</i> , <i>Verticilium dahliae</i> , <i>Fusarium</i> spp.) skupaj:	0	2	2	3	4	8	8
e) Virusi skupaj:	0	0,01	0,05	0,5	2	3	6
- od tega							
- znamenja težkega mozaika in črtavosti (PVY, PVA, PVX in/ali PVX) in znamenja virusa zvijanja listov (PLRV) skupaj največ :	0	0	0,03	0,1	0,25	0,5	1,5
- znamenja blagega mozaika (PVA, PVM, PVX ali PVS) skupaj največ:	0	0,01	0,05	0,5	2	3	6
- PAMV in AMV skupaj največ:	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01
- TRV in PMTV skupaj največ:	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01
f) Prazna mesta:	-	1	2	3	5	10	15
g) Samosevci	0 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	3 ⁽¹⁾	5 ⁽¹⁾	5 ⁽¹⁾	5 ⁽¹⁾
h) Zapeleveljenost (%) ⁽²⁾	-	10	10	10	10	10	10
i) Vrednostno število (največ) ⁽³⁾	0	3	4	8	15	30	65
2. Kontrola po izkopu gomoljev	(% rastlin)						
Znamenja težkega mozaika in virusa zvijanja listov skupaj:	0	0,1	0,5	2	4	7	10

(1) število rastlin/ha

(2) odstotek pokritosti površine s plevelnimi rastlinami

(3) število se ugotovi tako, da se ugotovljeni odstotek pomnoži s faktorjem:

- težke viroze: 25
- blagi mozaik in druge viroze: 2
- ostalo: 1

Razpredelnica 2: Zahteve za partije semenskega krompirja v prometu

Kategorija	Predosnovno seme		Osnovno seme in Certificirano seme
Stopnja	IS	S 1, S 2	vse stopnje
	v %		
Mokra gniloba krompirjevih gomoljev, bela trohnoba krompirja, krompirjeva plesen (<i>Pythium ultimum</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>Phytophthora infestans</i>) skupaj	0	(1)	0,5
- od tega krompirjeva plesen največ	0	0	1 gomolj na 100 kg (>35 mm) 1 gomolj na 50 kg (<35 mm)
Bela noga (<i>Thanatephorus cucumeris</i> = <i>Rhizoctonia solani</i>)	0	(1)	5
Črna pikavost gomoljev (<i>Colletotrichum coccodes</i>)	0	0	0,25
Srebrolikost (<i>Spondylocadium atrovirens</i>)	0	0	10 (2)
Navadna krastavost krompirja (<i>Streptomyces scabies</i>)	0	(1)	10 (2)
Prašnata krastavost (<i>Spongospora subterranea</i>)	0	0	5 (3)
Površinske poškodbe raznih vzrokov	1	1,5	1,5
Rjava pegavost na prerezu	0	5	5
Nekroze, vključno zaradi okužb s TRV ali MTV, ki obsegajo do 1/10 preseka gomolja	0	0	2
Poškodbe zaradi nizkih ali visokih temperatur	0	0	0
Gomoljev drugih sort	0	0	0,05
Primesi (utežnih %)	0,5	1	1
Deformacije gomoljev	3	3	3
Druge bolezni	0	0	2
Skupaj največ	4	8	20

(1) praviloma se ne pojavlja, izjemoma je mogoče najti posamezen gomolj

(2) gomolji s prizadeto površino od 1 - 25 %

(3) gomolji s prizadeto površino od 1 - 10 %