

Priloga I: Razvrstitev po telesni zgradbi

razvrstitev po telesni zgradbi	opis mesnatosti
S - nadstandard	zadnja četrt: dvojna omišičenost; profili izredno konveksni; hrbet: izredno konveksen, izredno širok, izredno debel; pleče: izredno konveksno in izredno debelo; izvrstna omišičenost (tip dvojno omišičenih trupov)
E - odličen	zadnja četrt: zelo debela, profili zelo konveksni; hrbet: zelo konveksen, zelo širok, zelo debel v ramenu (pleče); pleče: zelo konveksno in zelo debelo; vsi orisi so konveksni do zelo konveksni; izvrstna omišičenost
U - zelo dober	zadnja četrt: debela, profili konveksni; hrbet: širok in debel v ramenu; pleče: konveksno in debelo; orisi so v celoti konveksni; zelo dobra omišičenost
R - dober	zadnja četrt: profili v glavnem ravni; hrbet: debel, vendar manj širok v ramenu; pleče: dobro razvito, vendar manj debelo; orisi so v celoti ravni; dobra omišičenost;
O - zadovoljiv	zadnja četrt: profili so rahlo konkavni; hrbet: slaba širina in debelina; pleče: teži k suhosti; orisi so ravni do konkavni; povprečna omišičenost;
P - slab	zadnja četrt: orisi so konkavni do zelo konkavni; hrbet: mršav in konkaven z vidnimi kostmi; pleče: mršavo, ravno z vidnimi kostmi; vsi orisi so konkavni do zelo konkavni; slaba omišičenost;

Priloga II: Stopnja zamaščenosti (količina maščobe na površini in v notranjosti trupa)

stopnja zamaščenosti	dodatni pogoji		
1. nizka	zunanja	maščobna obloga v sledi ali nevidna	
	notranja	trebušna prsna	maščobna obloga v sledi ali nevidna na ledvicah maščobna obloga v sledi ali nevidna med rebri
2. rahla	zunanja	rahla maščobna obloga na delu trupa, vendar manj opazna v križu	
	notranja	trebušna prsna	sledovi maščobe ali manjši maščobni mešički na delu ledvic vidno mišičevje med rebri
3. povprečna	zunanja	meso je skoraj povsod na lahko prekrito z maščobo; področja tanjše maščobe na področju repa;	
	notranja	trebušna prsna	majhni sloji maščobnih mešičkov na delu ali celotnih ledvicah; mišičevje še vedno vidno med rebri;
4. visoka	zunanja	meso je rahlo prekrito z maščobo, vendar pa je ta tanjša v križu in debelejša na plečih;	
	notranja	trebušna prsna	ledvice so prekrite z maščobo mišice med rebri so prekrite z maščobo, obloge so lahko vidne na rebrih;
5. zelo visoka	zunanja	debela pokritost z maščobo	
	notranja	trebušna prsna	ledvice so v debeli plasti maščobe; mišice med rebri so infiltrirane z maščobo, vidna maščoba deponirana na rebrih;

Priloga III: Razvrščanje trupov jagnjet do 13 kg

kategorija	A		B		C	
masa trupa	≤7 kg		7,1 - 10 kg		10,1-13 kg	
kakovostni razred	1	2	1	2	1	2
barva mesa	svetlo rožnata	druga barva ali stopnja zamašče- nosti	svetlo rožnata ali rožnata	druga barva ali stopnja zamašče- nosti	svetlo rožnata ali rožnata	druga barva ali stopnja zamašče- nosti
zamaščenost*	(2) (3)		(2) (3)		(2) (3)	
(*) kot je določeno v prilogi II						