

Tabela V: Dovoljene količine kokcidiostatikov glede na vrsto in kategorijo živali:

Kokcidiostiki in drugi zdravilni dodatki	Vrsta ali kategorija živali	Največja starost	Količina v mg/kg krmne mešanice		Druge določbe
			naj- manjša	naj- večja	
Dekokvinat	Pitovni piščanci	—	20	40	Uporaba ni dovoljena najmanj 3 dni pred klanjem
Diklazuril	Pitovni piščanci	—	1	1	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem
	Pitovni purani	12 tednov	2	3	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem
Halofuginon	Pitovni piščanci	—	2	3	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem
	Pitovni purani	12 tednov	2	3	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem
	Piščanci - plemenski naraščaj	16 tednov	3	3	—
Lasalocid natrij ⁽³⁾	Pitovni piščanci	—	75	125	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem
	Piščanci-plemenski naraščaj	16 tednov	75	120	—
	Pitovni purani	12 tednov	90	125	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem.
Maduramicin amonij ⁽³⁾	Pitovni piščanci	—	5	5	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem
	Pitovni purani	16 tednov	5	5	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem
Monensin natrij ⁽³⁾	Pitovni piščanci	—	100	125	Uporaba ni dovoljena najmanj 3 dni pred klanjem
	Piščanci-plemenski	16 tednov	100	120	—
	Purani	16 tednov	90	100	Uporaba ni dovoljena najmanj 3 dni pred klanjem

Kokcidiosaiki in drugi zdravilni dodatki	Vrsta ali kategorija živali	Največja starost	Količina v mg/kg krmne mešanice		Druge določbe
			naj- manjša	naj- večja	
Narasin ⁽³⁾	Pitovni piščanci	—	60	70	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem
Nifursol ⁽³⁾	Purani	—	50	75	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem Največja dovoljena količina prahu določena po metodi Stauber-Heubach znaša 0,1 mg nifursola.
Robenidin	Pitovni piščanci in pitovni purani	—	30	36	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem
	Pitovni kunci	—	50	66	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem
Salinomycin natrij ⁽³⁾	Pitovni piščanci	—	50	70	Uporaba ni dovoljena najmanj 5 dni pred klanjem

⁽³⁾ V navodilu za uporabo je treba označiti:

»Nevarno za kopitarje; krmna mešanica vsebuje antibiotik iz skupine ionoforov; istočasna uporaba določenih zdravil (Tiamulin) je lahko kontraindicirana«.