

Priloga 3

Največje vrednosti parametrov umetno pripravljene zemljine, namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju zemljišč in zapolnjevanju izkopov

Tabela 1: Največje vrednosti anorganskih parametrov umetno pripravljene zemljine, ki je namenjena rekultivaciji tal na kmetijskih zemljiščih

Parameter	mg/kg s.s. za zemljino tipa A	mg/kg s.s. za zemljino tipa B
Arzen (As)	20	20
Svinec (Pb)	40	50
Kadmij (Cd)	0,5	0,7
Celotni krom (Cr)	40	40
Baker (Cu)	30	30
Nikelj (Ni)	30	30
Živo srebro (Hg)	0,2	0,3
Cink (Zn)	100	100

Tabela 2: Največje vrednosti organskih parametrov in AOX v izlužku umetno pripravljene zemljine, ki je namenjena rekultivaciji tal na kmetijskih zemljiščih.

Parameter	Vsebnost v mg/kg s.s.
Vsota ogljikovodikov (Σ CH) celokupna vsebnost	20, 50, 100, 200 ¹
PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki	2
BTX celotna vsebnost	0,1
PCB celotna vsebnost ²	0,1
AOX vsebnost eluata	0,3

- 1) vrednost 20 mg/kg velja za zemljo s $\text{TOC} \leq 0,3\%$,
vrednost 50 mg/kg velja za zemljo z $0,3\% < \text{TOC} \leq 0,5\%$
vrednost 100 mg/kg velja za zemljo z $0,5\% < \text{TOC} \leq 2\%$
vrednost 200 mg/kg velja za zemljo s $\text{TOC} > 2\%$
2) vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180.

Tabela 3: Največje vrednosti anorganskih parametrov in njihovih vsebnosti v izlužku za umetno pripravljeno zemljino, ki je namenjena rekultivaciji tal na nekmetijskih zemljiščih, ali je namenjena nasipavanju zemljišč in zapolnjevanju izkopov.

Parameter	mg/kg s.s.	Izlužek v mg/l
Arzen (As)	30	0,3
Svinec (Pb)	100	0,3
Kadmij (Cd)	1,1	0,03
Celotni krom (Cr)	90	0,3
Baker (Cu)	60 (90) ¹	0,6
Nikelj (Ni)	55	0,6
Živo srebro (Hg)	0,7	0,01
Cink (Zn)	300 (450) ¹	18

- 1) Pri zemljini s $\text{pH} > 7$ velja višja mejna vrednost

Tabela 4: Največje vrednosti organskih parametrov in njihovih vsebnosti v izlužku za umetno pripravljeno zemljino, ki je namenjena rekultivaciji tal na nekmetskih zemljiščih, ali je namenjena nasipavanju zemljišč in zapolnjevanju izkopov.

Parameter	mg/kg s.s.	Izlužek v mg/l
Vsota ogljikovodikov (Σ CH)	20, 50, 100, 200 ¹	5
PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki	2	
BTX	1	
PCB ²	0,1	
AOX kot klor, vsebnost eluata		0,3

- 1) vrednost 20 mg/kg s.s. velja za zemljo tipa A
vrednost 50 mg/kg s.s. velja za zemljo s $\text{TOC} \leq 0,5\%$
vrednost 100 mg/kg s.s. velja za zemljo z $0,5\% < \text{TOC} \leq 2\%$
vrednost 200 mg/kg s.s. velja za zemljo s $\text{TOC} > 2\%$
- 2) vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180.