

Priloga 1

SEZNAM PREDVIDENIH VRST UPORABE

Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje	Priporočeni rok uporabe	Druge določbe
1	2	3	4	5	6
Pomoč delovanju ledvic v primeru kronične ledvične insuficience	- nizka stopnja fosforja in omejena stopnja beljakovin, vendar visoke kakovosti	psi in mačke	- vir(i) beljakovin - kalcij - fosfor - kalij - natrij - vsebnost bistvenih maščobnih kislin, če so dodane	na začetku, do 6 mesecev (2)	V navodilih za uporabo navedite: 'Voda mora biti vedno na voljo.' Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo.'
Razkroj struvitnih kamnov (4)	- lastnosti acidifikacije urina, nizka stopnja magnezija, in omejena stopnja beljakovin, vendar visoke kakovosti	psi	- vir(i) beljakovin - kalcij - fosfor - natrij - magnezij - kalij - kloridi - žveplo - snovi, ki acidificirajo urin	5 do 12 tednov	V navodilih za uporabo navedite: 'Voda mora biti vedno na voljo.' Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo.'
	- lastnosti acidifikacije urina in nizka stopnja magnezija	mačke	- kalcij - fosfor - natrij - magnezij - kalij - kloridi - žveplo - celokupni tavin - snovi, ki acidificirajo urin		
Zmanjšanje ponovnega nastanka struvitnih kamnov (4)	- lastnosti acidifikacije urina in zmerna stopnja magnezija	psi in mačke	- kalcij - fosfor - natrij - magnezij - kalij - kloridi - žveplo - snovi, ki acidificirajo urin	do 6 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo.'
Zmanjšanje nastanka uratnih kamnov	nizka stopnja purinov, nizka stopnja beljakovin, vendar visoke kakovosti	psi in mačke	- vir(i) beljakovin	do 6 mesecev, vendar dosmrtna uporaba v primeru trajnih motenj v presnovi sečne kisline	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo.'
Zmanjšanje nastanka oksalatnih kamnov	nizka stopnja kalcija, nizka stopnja vitamina D, in lastnosti alkalizacije urina	psi in mačke	- fosfor - kalcij - natrij - magnezij - kalij - kloridi - žveplo - celokupni vitamin D - hidroksiprolin - snovi, ki alkalizirajo urin	do 6 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo.'

Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje	Priporočeni rok uporabe	Druge določbe
1	2	3	4	5	6
Zmanjšanje nastanka cistinskih kamnov	nizka stopnja beljakovin, zmerna stopnja žveplovih amino kislin, in lastnosti alkalizacije urina	psi in mačke	- celokupne žveplove amino kisline - natrij - kalij - kloridi - žveplo - snovi, ki alkalizirajo urin	na začetku, do 1 leta	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe.'
Zmanjšanje intolerance za sestavine in hranilne snovi (5)	- izbrani vir(i) beljakovin in/ali - izbrani vir(i) ogljikovih hidratov	psi in mačke	- vir(i) beljakovin vsebnost bistvenih maščobnih kislin (če so dodane) - vir(i) ogljikovih hidratov vsebnost bistvenih maščobnih kislin (če so dodane)	3 do 8 tednov: če izginejo znaki intolerance, se ta hrana lahko uporablja neomejeno	-
Zmanjšanje akutnih motenj absorpcije v črevesju	zvišana stopnja elektrolitov in hitro prebavljivih sestavin	psi in mačke	- hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi - natrij - kalij - vir(i) sluznih snovi (če so dodane)	1 do 2 tedna	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'V obdobju akutne diareje ter okrevanja po boleznih.' 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo.'
Izravnavanje za slabo presnovo (6)	hitro prebavljive sestavine in nizka stopnja maščob	psi in mačke	hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi	3 do 12 tednov, vendar vse življenje v primeru kronične pankreasne insuficience	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo.'
Pomoč delovanju srca v primeru kronične kardialne insuficience	nizka stopnja natrija in povečano razmerje K/Na	psi in mačke	- natrij - kalij - magnezij	na začetku, do 6 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe.'
Upravljanje dovajanja glukoze (<i>Diabetes melitus</i>)	nizka stopnja ogljikovih hidratov za hitro sproščanje glukoze	psi in mačke	vir(i) ogljikovih hidratov - po potrebi obdelani ogljikovi hidrati škrob - celokupni sladkor - fruktoza (če je dodana) - vsebnost bistvenih maščobnih kislin (če so dodane) - vir(i) maščobnih kislin s kratko in srednjo verigo (če so dodane)	na začetku, do 6 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe.'
Pomoč delovanju jeter v primeru kronične insuficience jeter	visoko kakovostne beljakovine, zmerna stopnja beljakovin, visoka stopnja bistvenih maščobnih kislin in visoka stopnja hitro prebavljivih ogljikovih hidratov	psi	- vir(i) beljakovin - vsebnost bistvenih maščobnih kislin - hitro prebavljivi ogljikovi hidrati, obdelani po potrebi - natrij - celokupni baker	na začetku, do 6 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe.' V navodilih za uporabo navedite: 'Voda mora biti vedno na voljo.'

Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje	Priporočeni rok uporabe	Druge določbe
1	2	3	4	5	6
	- visoko kakovostne beljakovine, zmeroma stopnja beljakovin in visoka stopnja bistvenih maščobnih kislin	mačke	- vir(i) beljakovin - vsebnost bistvenih maščobnih kislin - natrij - celokupni baker		Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe.' V navodilih za uporabo navedite: 'Voda mora biti vedno na voljo.'
Uravnavanje presnove lipidov v primeru hiperlipidemije	- nizka stopnja maščobe in visoka stopnja bistvenih maščobnih kislin	psi in mačke	- vsebnost bistvenih maščobnih kislin - vsebnost maščobnih kislin n-3 (če so dodane)	na začetku, do 2 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe.'
Znižanje bakra v jetrih	- nizka stopnja bakra	psi	celokupni baker	na začetku, do 6 mesecev	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe.'
Znižanje odvečne telesne teže	nizka gostota energije	psi in mačke	- energetska vrednost (izračunana po metodi ES)	do dosežene ciljne telesne teže	V navodilih za uporabo je treba navesti primeren dnevni odmerek
Ponovno uvajanje normalne prehrane, okrevanje (¹)	- visoka gostota energije, visoke koncentracije bistvenih hranljivih snovi in hitro prebavljive sestavine	psi in mačke	- hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi - energetska vrednost (izračunana po metodi ES) - vsebnost maščobnih kislin n-3 in n-6 (če so dodane)	do vzpostavitve prvotnega stanja	Če se posebej zahteva dajanje krmila po sondi, na pakiranju, vsebniku ali na nalepki navedite: 'Uporaba pod nadzorom veterinarja'
(¹) v primeru krmil za mačke lahko proizvajalec za poseben prehranski namen navede: »Hepatična lipidoza pri mačkah«.					
Pomoč delovanju kože v primeru dermatoze in pretiranega izpadanja dlak	- visoka stopnja bistvenih maščobnih kislin	psi in mačke	- vsebnost bistvenih maščobnih kislin	do 2 meseca	Navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo.'
Zmanjšanje tveganja za »mlečno« mrzlico (poporodno/puerperalno parezo)	- nizka stopnja kalcija in/ali - nizko razmerje kationi/anioni	krave mlečnice	- kalcij - fosfor - magnezij - kalcij - fosfor - natrij - kalij - kloridi - žveplo	1 do 4 tednov pred telitvijo	V navodilih za uporabo navedite: 'Hranjenje prekiniti po telitvi.'
Zmanjšanje tveganja za ketozo (7) (8)	sestavine zagotavljajo vire glukogene energije	krave in ovce mlečnice	- sestavine zagotavljajo vire glukogene energije - propan-1,2-diol (če je dodan kot znanilec glukoze) - glicerol (če je dodan kot znanilec glukoze)	3 do 6 tednov po telitvi (9) Zadnjih 6 tednov pred, in prve 3 tedne po jagnjivosti (10)	

Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje	Priporočeni rok uporabe	Druge določbe
1	2	3	4	5	6
Zmanjšanje tveganja za tetanijo telet (hipomagnezemijo)	visoka stopnja magnezija, lahko dostopni ogljikovi hidrati, zmerna stopnja beljakovin in nizka stopnja kalija	prežvekovalci (teleta)	- škrob - celokupni sladkorji - magnezij - natrij - kalij	3 do 10 tednov v obdobjih hitre rasti trave	V navodilih za uporabo je treba navesti smernice o dnevnem obroku, v zvezi z dodajanjem vlaknin in lahko dostopnih virov energije. V primeru krmil za ovce navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Zlasti za samice ovac v laktaciji.'
Zmanjšanje tveganja za acidozo	nizka stopnja lahko fermentirajočih ogljikovih hidratov in visoka sposobnost puferiranja	prežvekovalci	- škrob - celokupni sladkorji	največ 2 meseca (11)	V navodilih za uporabo je treba navesti smernice za uravnoteženi dnevni obrok, v zvezi z dodajanjem vlaknin in virov lahko fermentirajočih ogljikovih hidratov. V primeru krmil za krave mlečnice navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Zlasti za visoko proizvodne krave.' V primeru krmil za prežvekovalce za pisanje navedite na pakiranju, vsebniku ali nalepki: 'Zlasti za intenzivno hranjene ...' (12)
Ohranjanje ravnotežja med vodo in elektroliti	pretežno elektroliti in lahko absorbirajoči ogljikovi hidrati	teleta pujski jagnjeta kozlički žrebata	- vir(i) ogljikovih hidratov - natrij - kalij - kloridi	1 do 7 dni (1 do 3 dni, če se hranijo ekskluzivno)	Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: 'V primeru tveganja, v obdobjih, ali med okrevanjem od prebavnih motenj (diareja). Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo.'
Zmanjšanje tveganja za nastanek uratnih kamnov	- nizka stopnja fosforja, magnezija ter lastnosti acidifikacije urina	prežvekovalci	- kalcij - fosfor - natrij - magnezij - kalij - kloridi - žveplo - snovi, ki acidificirajo urin	do 6 tednov	Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: 'Zlasti za intenzivno hranjene mlade živali.' V navodilih za uporabo navedite: 'Voda mora biti vedno na voljo.'
Zmanjšanje reakcije na stres	- visoka stopnja magnezija in/ali - hitro prebavljivih sestavin	prašiči	- magnezij - hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi - vsebnost maščobnih kislin n-3 (če so dodane)	1 do 2 dni	Navodila za dajanje hrane morajo biti na voljo vedno, kadar je primerna uporaba te hrane.
Ustalitev fiziološke prebave	- nizka sposobnost puferiranja, in hitro prebavljive sestavine	pujski	- hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi - sposobnost puferiranja - vir(i) sredstev za strjevanje (če so dodane) - vir(i) sluznih snovi (če so dodane)	2 do 4 tedne	Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: 'V primeru tveganja, v obdobjih, ali med okrevanjem od prebavnih motenj.'

Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje	Priporočeni rok uporabe	Druge določbe
1	2	3	4	5	6
	- hitro prebavljive sestavine	prašiči	- hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi - vir(i) sluznih snovi (če so dodane)		
Zmanjšanje tveganja zaprtja	sestavine, ki pospešujejo prehodnost črevesja	svinje	sestavine, ki pospešujejo prehodnost črevesja	10 do 14 dni pred in 10 do 14 dni po praritvi	-
Zmanjšanje tveganja za sindrom zamaščenih jeter	nizka energija in visok delež energije, ki metabolizira iz lipidov, z visoko stopnjo polinenasičenih maščobnih kislin	kokoši nesnice	- energetska vrednost (izračunana po metodi ES) - odstotek energije, ki metabolizira iz lipidov - vsebnost polinenasičenih maščobnih kislin	do 12 tednov	-
Izravnavo za slabo absorpcijo	- nizka stopnja nasičenih maščobnih kislin in visoka stopnja vitaminov, topnih v maščobi	perutnina, razen gosi in golobov	- odstotek nasičenih maščobnih kislin glede na celokupne maščobne kisline - celokupni vitamin A - celokupni vitamin D - celokupni vitamin E - celokupni vitamin K	v prvih dveh tednih po izvalitvi	-
Izravnavo za kronično insuficienco delovanja tankega črevesa	- hitro prebavljivi ogljikovi hidrati, beljakovine in maščobe pred vstopom v slepič	kopitarji ⁽²⁾	- vir(i) hitro prebavljivih ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob, obdelanih po potrebi	na začetku, do 6 mesecev	Navodila za dajanje hrane morajo biti na voljo vedno, kadar je primerna uporaba te hrane ter način dajanja hrane, s pogostimi majhnimi dnevnimi obroki. Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe.'
Izravnavo za kronično insuficienco delovanja debelega črevesa	- hitro prebavljive vlaknine	kopitarji	- vir(i) vlaknin - vsebnost maščobnih kislin n-3 (če so dodane)	na začetku, do 6 mesecev	Navodila za dajanje hrane morajo biti na voljo vedno, kadar je primerna uporaba te hrane ter način dajanja hrane. Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe.'
Zmanjšanje reakcije na stres	- hitro prebavljive sestavine	kopitarji	- magnezij - hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi - vsebnost maščobnih kislin n-3 (če so dodane)	2 do 4 tedne	Navodila za dajanje hrane morajo biti na voljo za točno določene primere, ko je primerna uporaba te hrane.

Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje	Priporočeni rok uporabe	Druge določbe
1	2	3	4	5	6
Izravnavanje za izgubo elektrolitov v primerih močnega potenja	zlasti elektroliti in lahko absorbirajoči ogljikovi hidrati	kopitarji	- kalcij - natrij - magnezij - kalij - kloridi - glukoza	eden do treh dni	Navodila za dajanje hrane morajo biti na voljo vedno, kadar je primerna uporaba te hrane. Kadar hrana ustreza precejšnjemu delu dnevnega obroka, morajo biti na voljo navodila za preprečitev tveganja hitrih sprememb v vrsti hrane. V navodilih za uporabo navedite: 'Voda mora biti vedno na voljo.'
Uvajanje normalne prehrane po bolezni, okrevanje	– visoka koncentracija osnovnih hranilnih snovi in hitro prebavljivih sestavin	kopitarji	- hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi - vsebnost maščobnih kislin n-3 in n-6 (če so dodane)	do popolnega okrevanja	Navodila za dajanje hrane morajo biti na voljo vedno, kadar je primerna uporaba te hrane. Če se posebej zahteva dajanje krmila po sondi, na pakiranju, vsebniku ali na nalepki navedite: 'Dajati pod nadzorom veterinarja'
Pomoč delovanju jeter v primeru kronične insuficience jeter	- nizka stopnja beljakovin, vendar visoke kakovosti, in hitro prebavljivi ogljikovi hidrati	kopitarji	- vir(i) beljakovin in vlaknin - hitro prebavljivi ogljikovi hidrati, obdelani po potrebi - metionin - holin - vsebnost maščobnih kislin n-3 (če so dodane)	na začetku, do 6 mesecev	Na voljo morajo biti navodila o načinu dajanja hrane, s pogostimi majhnimi dnevnimi obroki. Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe.'
Pomoč delovanju ledvic v primeru kronične renalne insuficience	– nizka stopnja beljakovin, vendar visoke kakovosti, in nizka stopnja fosforja	kopitarji	– vir(i) beljakovin – kalcij – fosfor – kalij – magnezij – natrij	na začetku, do 6 mesecev	Na pakiranju, vsebniku ali nalepki navedite: 'Priporočljivo je poiskati mnenje veterinarja pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe.'
(2) V primeru posebej pripravljenih krmil za izpolnjevanje posebnih pogojev zelo starih živali (sestavine, ki se enostavno zaužijejo) je treba ob vrsti ali kategoriji živali navesti tudi 'stare živali'.					

(1) Če je primerno, lahko proizvajalec priporoča uporabo tudi pri začasni renalni insuficienci.

(2) Če se krma priporoča za začasno renalno insuficienco, je priporočeni rok uporabe dva do štiri tedne.

(3) V primeru krme za mačke lahko navedete "obolenje spodnjega urinarnega trakta pri mačkah" ali "urološki sindrom pri mačkah - F.U.S." kot poseben prehranski namen.

(4) V primeru krme za posebno intoleranco lahko navedba posebne intolerance zamenja "sestavino in hranljivo snov".

(5) Proizvajalec lahko navede kot posebni prehranski namen "eksokrina pankreasna insuficienca".

(6) V primeru krme za mačke lahko proizvajalec navede posebni prehranski namen "felina hepatična lipidoza"

(7) Izraz "ketoza" se lahko zamenja z "acetonemija".

(8) Proizvajalci lahko priporočajo uporabo pri okrevanju po ketozi.

(9) V primeru krme za krave molznice.

(10) V primeru krme za samice ovac.

(11) V primeru krme za krave molznice: "največ dva meseca po začetku laktacije".

(12) Navedite kategorijo prežvekovalcev.

(13) V primeru posebej pripravljene krme za izpolnjevanje posebnih potreb zelo starih živali (sestavine, ki se enostavno zaužijejo), je treba ob vrsti in kategoriji živali navesti tudi "stare živali".