

PRILOGA 2

MINIMALNE ZAHTEVE ZA KAKOVOST PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA

A. Za semenski krompir so glede primesi, poškodb in bolezni dovoljena naslednja odstopanja:

- | | |
|---|-------------|
| 1. prisotnost zemlje in tujih primesi | 2 utežna % |
| 2. suha trohnoba in mokra gniloba, razen če jo povzroča <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 1984 ali <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith | 1 utežni % |
| 3. zunanje poškodbe, npr. zmaličeni ali poškodovani gomolji | 3 utežne % |
| 4. navadna krastavost krompirja: gomolji prizadeti po več kot tretjini površine | 5 utežnih % |
| Skupno dovoljeno odstopanje za točke od 2 do 4. | 6 utežnih % |

B. Semenski krompir ne sme biti okužen z *Globodera rostochiensis* (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975, *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 1984 in *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.