

DEL A

Morfološke lastnosti, ki se upoštevajo pri postopku preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte vinske trte

1. TVORBA LISTNIH BRSTOV NA RASTOČI ROZGI, DOLGI 10 DO 20 CM
 - 1.1. oblika
 - 1.2. barva (ob odprtju, da se omogoči opazovanje antocianov)
 - 1.3. dlakavost
2. ZELENA ROZGA V ČASU CVETENJA
 - 2.1. prečni prerez (oblika in kontura)
 - 2.2. dlakavost
3. OLESENELA ROZGA
 - 3.1. površina
 - 3.2. internodiji
4. PORAZDELITEV VITIC
5. MLADI LISTI NA VRHU RASTOČE ROZGE, DOLGE 10 do 30 cm (prvi trije listi brez listnih brstov, šteto od te točke)
 - 5.1. barva
 - 5.2. dlakavost
6. RAZVITI LISTI (ki se nahajajo med 8. in 11. nodijem)
 - 6.1. fotografija
 - 6.2. risba ali neposredni odtis, z merilom
 - 6.3. splošna oblika
 - 6.4. število listnih krp
 - 6.5. oblika peceljnega sinusa
 - 6.6. globina zgornjega in spodnjega stranskega sinusa
 - 6.7. dlakavost spodnje strani lista
 - 6.8. površina
 - 6.9. stranska nazobčanost
7. CVET
 - 7.1. viden spol
8. TEHNOLOŠKA ZRELOST GROZDJA (za vinske in namizne sorte)
 - 8.1. fotografija (z merilom)
 - 8.2. oblika
 - 8.3. velikost
 - 8.4. pecelj (dolžina)
 - 8.5. povprečna teža v gramih
 - 8.6. trganje
 - 8.7. kompaktnost grozda
9. TEHNOLOŠKA ZRELOST JAGOD (pri vinskih in namiznih sortah)
 - 9.1. fotografija (z merilom)
 - 9.2. oblika
 - 9.3. oblika z navedbo povprečne teže
 - 9.4. barva
 - 9.5. kožica (pri namiznih sortah)
 - 9.6. število pešk (pri namiznih sortah)
 - 9.7. pulpa

- 9.8. sok
- 9.9. okus

10. SEME (pri vinskih in namiznih sortah): fotografija obeh strani in profila (z merilom).

DEL B

Fiziološke lastnosti, ki se upoštevajo pri postopku preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte vinske trte

1. VEGETATIVNI RAZVOJ:

1.1. Določitev fenoloških datumov:

Fenološki datumi se določijo v primerjavi z eno ali več primerjalnimi sortami.

1.2. Datum brstenja

Datum, ko se polovica očes obrezane vinske trte razpoči in se pokaže njihova notranja dlakavost glede na primerjalne sorte.

1.3. Datum polnega cvetenja

Datum, ko se odpre polovica cvetov na določenem številu rastlin v primerjavi s primerjalnimi sortami.

1.4. Zrelost (pri vinskih in namiznih sortah)

Poleg obdobja zrelosti je treba označiti tudi gostoto ali predvideno vsebnost sladkorja v moštu, vsebnost kislin v moštu in ustrezen pridelek grozdja, izražen v kilogramih na hektar, v primerjavi z eno ali več primerjalnimi sortami, ki po možnosti dajejo podobno velik pridelek.

2. PRIDELOVALNE LASTNOSTI

2.1. Moč rasti

2.2. Način rasti (položaj prvega rodnega brsta, prevladujoča oblika)

2.3. Proizvodnost

2.3.1. rednost

2.3.2. pridelek

2.3.3. anomalije

2.4. Odpornost ali občutljivost

2.4.1. na neugodne razmere

2.4.2. na škodljivce

2.4.3. nagnjenost k pokanju jagod

2.5. Obnašanje med vegetativnim razmnoževanjem

2.5.1. pri cepljenju

2.5.2. pri razmnoževanju s potaknjenci

3. UPORABA

3.1. Za vinske sorte

3.2. Za namizne sorte

3.3. Za podlage

3.4. Za industrijsko rabo