

Priloga 1

LISTA BOLEZNI

Bolezen	Najdaljša inkubacijska doba	Klinični znaki
goveja kuga	21 dni	<ul style="list-style-type: none"> - povišana telesna temperatura - živali se močno solzijo, pojavi se gnojni očesni in nosni izcedek - pojavijo se erozije in vnetje prebavnega trakta ter driska - breje živali lahko abortirajo - obolenost in smrtnost sta visoki
kuga drobnice	21 dni	<ul style="list-style-type: none"> - povišana telesna temperatura - neješčnost - driska - izcedek iz oči in nosu
vezikularna bolezen prašičev	28 dni	<ul style="list-style-type: none"> - vezikularne spremembe v ustih in na parkljih prašičev
epizootska hemoragična bolezen jelenjadi	40 dni	<ul style="list-style-type: none"> - izguba apetita, otopelost, izguba orientacije, znaki ohromelosti, hitro dihanje, slinjenje - izguba strahu pred ljudmi - z napredkom bolezni opazimo pomodrelo ustno sluznico, erozije ustne sluznice, krvav izcedek iz ust in nosu, otekel jezik - 8 do 36 ur po pojavu znakov nastopi šoku podobno stanje, žival nemočno obleži in pogine
osepnice ovac in koz	21 dni	<ul style="list-style-type: none"> - tipične spremembe se pojavljajo predvsem na območju pod repom - generalizirana oblika s spremembami po vsem telesu se pojavlja pri jagnjetih in kozličih
vezikularni stomatitis	21 dni	<ul style="list-style-type: none"> - povišana telesna temperatura pri večjem številu živali (govedo, konji in prašiči) - vezikularne spremembe v ustih in na koronarnem svitku
nalezljiva ohromelost prašičev	40 dni	<ul style="list-style-type: none"> - hiperestezija - tremor - pareze in konvulzije
vozličasti dermatitis	28 dni	<ul style="list-style-type: none"> - povišana telesna temperatura - depresija, slinjenje, izcedek iz oči in nosu - šepanje - otekle bezgavke in naježenost dlake nad kepastimi spremembami - specifični vozliči, premera 0,5-5 mm, ki se pojavljajo po koži glave, vratu, okončin in genitalij
mrzlica doline Rift	30 dni	<ul style="list-style-type: none"> - nenaden pojav povišane telesne temperature - motnje v koordinaciji - nenadni pogini - pri brejih živalih se pojavijo abortusi oziroma mrtvorojenost