

Preglednica 3: Priporočila za izvajanje zdravstvenega nadzora in biološkega monitoringa

PbB (µg/100 ml)	> vrednost od vrednosti, ki jo ima referenčna populacija, ali 40	41–50	51–60	61–70	≥ 70
Vrsta delavcev*					
običajni delavci	priporočilo: izvajanje zdravstvenega nadzora in biološkega monitoringa v rokih, ki jih določi pooblaščen zdravnik	obvezno: izvajanje zdravstvenega nadzora in biološkega monitoringa priporočilo: izvajanje zdravstvenega nadzora enkrat letno in biološkega monitoringa vsakih 6 mesecev	priporočilo: – pregled delovnih razmer in sprememb na delovnem mestu, – izvajanje zdravstvenega nadzora enkrat ali večkrat letno (odločitev pooblaščenega zdravnika) in – izvajanje biološkega monitoringa vsake četrta leta	obvezno: pregled delovnih razmer in sprememb na delovnem mestu priporočilo: – premestitev delavca na drugo delovno mesto,** – izvajanje zdravstvenega nadzora enkrat ali večkrat letno (odločitev pooblaščenega zdravnika) in – izvajanje biološkega monitoringa vsake četrta leta	
noseče in doječe delavke	priporočilo: premestitev delavke na drugo delovno mesto**				

PbB (µg/100 ml)	> vrednost od vrednosti, ki jo ima referenčna populacija, ali 40	41–50	51–60	61–70	≥ 70
Vrsta delavcev*					
mladi delavci (pod 18 let)	priporočilo: izvajanje zdravstvenega nadzora in biološkega monitoringa v rokih, ki jih določi pooblaščen zdravnik	priporočilo: – pregled delovnih razmer in sprememb na delovnem mestu, – izvajanje zdravstvenega nadzora enkrat letno in – izvajanje biološkega monitoringa vsake četrta leta	priporočilo: – premestitev delavca na drugo delovno mesto,** – izvajanje zdravstvenega nadzora enkrat ali večkrat letno (odločitev pooblaščenega zdravnika) in – izvajanje biološkega monitoringa vsaka 2 meseca		

* Pri izvajanju zdravstvenega nadzora je treba upoštevati osebne značilnosti delavcev.

** Ponovna vrnitev na delo je mogoča, kadar pooblaščen zdravnik meni, da tveganja za ženske, plod ali dojenčka, ki uživa materino mleko, ni več.

*** Ponovna vrnitev na delo je mogoča, kadar je koncentracija svine v krvi PbB nižja od zavezujoče biološke mejne vrednosti pri dveh zaporednih meritvah (v presledku dveh mesecev).