

PRILOGA

Klinični znaki konjske kuge

Konjska kuga se pojavlja v štirih klasičnih oblikah:

Oblika bolezni	Inkubacijska doba	Klinični znaki
perakutna ali pljučna	3 do 5 dni	- povišana telesna temperatura do 41 °C - oteženo dihanje in progresivno slabšanje dihanja - povišana frekvenca dihanja na 60 do 75 vdihov/minuto - boleč kašelj, penast izcedek iz nosnic - pogin nastopi nekaj ur po prvih kliničnih znakih
subakutna ali srčna	7 do 14 dni	- povišana telesna temperatura (39 do 41 °C), ki traja 3 do 6 dni - otekline po glavi, okrog oči, po ustnicah, jeziku, v intermandibularnem prostoru in področju grla; otekline se lahko razširijo na prsni del in rame, redko zajamejo spodnje dele okončin - pikčaste krvavitve po očesnih veznicah in spodnji strani jezika - pogin nastopi zaradi odpovedi srca, ponavadi 4 do 8 dni po pojavu kliničnih znakov - smrtnost je 50%
akutna ali mešana		- mešanica pljučne in srčne oblike - smrtnost je okrog 70% in se pojavi 3 do 6 dni po dvigu telesne temperature - lahko se kaže z: - o začetnimi blagimi znaki pljučne oblike, sledi močno otekanje glave in vratu, nato pogin zaradi odpovedi srca - o oteklina, značilnimi za subakutno obliko, sledi nenaden pojav oteženega dihanja in drugi klinični znaki, tipični za perakutno obliko
vročica	5 do 14 dni	- povišana telesna temperatura remitentnega značaja (39 do 41 °C), ki traja 5 do 8 dni - drugi klinični znaki (povišan srčni utrip, neješčnost, otekline) so zelo neznačilni - poginov ni