

PRILOGA 2**MINIMALNI POGOJI KAKOVOSTI ZA PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA**

1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati partije semenskega krompirja kategorije predosnovno seme:

- prisotnost zemlje in tujih primesi ne sme presegati 1,0 utežnega %;
- masa gomoljev, ki jih je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, količinsko ne sme presegati 0,2 utežnega %;
- masa gomoljev z zunanjimi poškodbami, vključno z izmaličenimi ali poškodovanimi gomolji, ne sme presegati 3,0 utežnih %;
- masa gomoljev z navadno krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot tretjino površine gomolja, ne sme presegati 5,0 utežnih %;
- masa gomoljev z belo nogo krompirja, ki prizadene več kot 10,0 % površine gomolja, ne sme presegati 1,0 utežnega %;
- masa gomoljev s prašnato krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot 10,0 % površine gomolja, ne sme presegati 1,0 utežnega %;
- masa gomoljev, uvelih zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrolikost krompirja, ne sme presegati 0,5 utežnega %.

Skupna masa gomoljev iz druge do sedme alineje te točke ne sme presegati 6,0 utežnih %.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati partije semenskega krompirja kategorije osnovno seme in kategorije certificirano seme:

- prisotnost zemlje in tujih primesi: največ 1,0 utežni % v kategoriji osnovno seme in največ 2,0 utežna % v kategoriji certificirano seme;
- masa gomoljev, ki jih je prizadela suha trohnoba ali mokra gniloba, razen če jo povzroča *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann etKotthoff) Davis et al. ali *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabbuchi et al.: največ 0,5 utežnega %, od tega največ 0,2 utežnega % mokre gnilobe;
- masa gomoljev z zunanjimi poškodbami, kot so npr. zmaličeni ali poškodovani gomolji: največ 3,0 utežni %;
- masa gomoljev z navadno krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot tretjino površine gomolja: največ 5,0 utežnih %;
- masa gomoljev z belo nogo krompirja, ki prizadene več kot 10,0 % površine gomolja: največ 5,0 utežnih %;
- masa gomoljev s prašnato krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot 10,0 % površine gomolja: največ 3,0 utežni %;
- gomolji, uveli zaradi izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrolikost krompirja: največ 1,0 utežni %.

Skupna masa gomoljev iz druge do sedme alineje te točke ne sme presegati 6,0 utežnih % v kategoriji osnovno seme in 8,0 utežnih % v kategoriji certificirano seme.