

Priloga 2

»

PRILOGA 8

METODA ZA IZVEDBO ČIŠČENJA PASTI, VNOSA PODATKOV ULOVA, UGOTAVLJANJA PRENAMNOŽITVE LUBADARJA TER POLETNEGA SPREMLJANJA POPULACIJ

1. Čiščenje pasti: v času, ko najvišje dnevne temperature presegajo 24 °C in več, je treba pasti čistiti enkrat tedensko, ko pa so najvišje dnevne temperature do 24 °C, zadošča, da se pasti čistijo enkrat na deset dni, pri najvišji dnevni temperaturi pod 20 °C pa na 14 dni.
2. Vnos podatkov ulova: podatke o ulovu v kontrolne pasti se tekoče vnašajo v računalniški program Varstva gozdov.
3. Ugotavljanje prenamnožitve lubadarja: v primeru, ko ulov preseže 9.000 osebkov na kontrolno past ali ko je na kontrolnih nastavah gostota vhodnih odprtin večja kot ena odprtina na en dm², se šteje, da je populacija osmerozobega smrekovega lubadarja (*Ips typographus* L.) prenamnožena. Populacija šesterezobega smrekovega lubadarja (*Pityogenes chalcographus* L.) je prenamnožena, ko ulov preseže 20.000 osebkov na kontrolno past ali ko je na kontrolnih nastavah gostota vhodnih odprtin večja kot dve odprtini na en dm².
4. Nujnost poletnega spremljanje populacij: poletno spremljanje v obdobju od julija do avgusta se izvaja po večjih naravnih ujmah in drugih nenadnih škodljivih vplivih na gozd v tekočem letu.

«.