

## Priloga

## »Priloga 1

## LISTA BOLEZNI

| Bolezen                        | Najdaljša inkubacijska doba | Klinični znaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goveja kuga                    | 21 dni                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• povišana telesna temperatura</li> <li>• živali se močno solzijo, pojavi se gnojni očesni in nosni izcedek</li> <li>• pojavijo se erozije in vnetje prebavnega trakta ter driska</li> <li>• breje živali lahko abortirajo</li> <li>• obolevnost in smrtnost sta visoki</li> </ul>                                                                                        |
| Kuga drobnice                  | 21 dni                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• povišana telesna temperatura, neješčnost, driska</li> <li>• izcedek iz oči in nosu</li> <li>• nekrotično vnetje sluznice ust</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vezikularna bolezen prašičev   | 28 dni                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• vezikularne spremembe v ustih in na parkljih prašičev</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Epizootska hemoragična bolezen | 40 dni                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• izguba apetita, otopelost, izguba orientacije, znaki ohromelosti, hitro dihanje, slinjenje, izguba strahu pred ljudmi</li> <li>• z napredkom bolezni opazimo pomodrelo ustno sluznico, erozije ustne sluznice, krvav izcedek iz ust in nosu, otekel jezik</li> <li>• 8 do 36 ur po pojavu znakov nastopi šoku podobno stanje, žival nemočno obleži in pogine</li> </ul> |
| Osepnice ovac in koz           | 21 dni                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tipične spremembe se pojavljajo predvsem na območju pod repom</li> <li>• generalizirana oblika s spremembami po vsem telesu se pojavlja pri jagnjetih in kozličih</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| Vezikularni stomatitis         | 21 dni                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• povišana telesna temperatura pri večjem številu živali pri govedu, konjih in prašičih</li> <li>• vezikularne spremembe v ustih in na koronarnem svitku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Vozličasti dermatitis          | 28 dni                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• povišana telesna temperatura</li> <li>• depresija, slinjenje, izcedek iz oči in nosu</li> <li>• šepanje</li> <li>• otekle bezgavke in naježenost dlake nad kepastimi spremembami - specifični vozlički, premera 0,5-5 mm, ki se pojavljajo po koži glave, vratu, okončin in genitalij</li> </ul>                                                                        |
| Mrzlica doline Rift            | 30 dni                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nenaden pojav povišane telesne temperature</li> <li>• motnje v koordinaciji</li> <li>• nenadni pogini</li> <li>• pri brejih živalih se pojavijo abortusi oziroma mrtvorjenost</li> </ul>                                                                                                                                                                                |