

Priloga 1

»Priloga 1

1. Pogostost vzorčenja mletega mesa v odvisnosti od obsega proizvodnje

Letni obseg proizvodnje	Vrsta mesa glede na vrsto živali	Pogostost vzorčenja	
		Začetna pogostost vzorčenja	Zmanjšana pogostost vzorčenja (v primeru zadovoljivih rezultatov)
od 60 ton do vključno 120 ton mletega mesa	vse vrste mesa	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na 2 tedna, da se pridobi vsaj 6 zaporednih rezultatov	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na mesec
		<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na 2 tedna, da se pridobi vsaj 4 zaporedne rezultate	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec
od 13 ton do vključno 59 ton mletega mesa	vse vrste mesa	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3 zaporedne rezultate	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca
	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3 zaporedne rezultate	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni mogoče
od 7 ton do vključno 12 ton mletega mesa	vse vrste mesa	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na 4 mesece
	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na mesec	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni mogoče

od 1,2 tone do vključno 6 ton mletega mesa	vse vrste mesa	<u>E.coli</u> in <u>SŠMO</u>: 1 vzorec enkrat na 3 mesece, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>E.coli</u> in <u>SŠMO</u>: 1 vzorec enkrat na 6 mesecev
	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.</u>: 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>Salmonella spp.</u>: 1 skupni vzorec enkrat na 6 mesecev
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.</u>: 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca	<u>Salmonella spp.</u>: zmanjšanje frekvence ni mogoče
manj kot 1,1 tone mletega mesa	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.</u>: 1 skupni vzorec na leto (v času največje sezonske proizvodnje mletega mesa)	<u>Salmonella spp.</u>: zmanjšanje frekvence ni mogoče
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.</u>: 2 skupna vzorca na leto (vsaj en vzorec v času največje sezonske proizvodnje mletega mesa)	<u>Salmonella spp.</u>: zmanjšanje frekvence ni mogoče

Izrazi v tabeli pomenijo:

- SŠMO je skupno število aerobnih mikroorganizmov;
- mleto meso kot je določeno z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, člena 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES);
- vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot;
- skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

2. Pogostost vzorčenja mesnih pripravkov v odvisnosti od obsega proizvodnje

Letni obseg proizvodnje	Vrsta mesa glede na vrsto živali	Pogostost vzorčenja	
		Začetna pogostost vzorčenja	Zmanjšana pogostost vzorčenja (v primeru zadovoljivih rezultatov)
od 60 ton do vključno 120 ton mesnih pripravkov	vse vrste mesa	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 2 tedna, da se pridobi vsaj 6 zaporednih rezultatov	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na mesec
		<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na 2 tedna, da se pridobi vsaj 4 zaporedne rezultate	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec
	vse vrste mesa	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3 zaporedne rezultate	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca
od 13 ton do vključno 59 ton mesnih pripravkov	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3 zaporedne rezultate	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni mogoče
	vse vrste mesa	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 4 mesece
od 7 ton do vključno 12 ton mesnih pripravkov	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na mesec	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni mogoče

od 1,2 tone do vključno 6 ton mesnih pripravkov	vse vrste mesa	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 3 mesece, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 6 mesecev
	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 6 mesecev
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni mogoče
manj kot 1,1 tone mesnih pripravkov	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na leto (v času največje sezonske proizvodnje mesnih pripravkov)	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni mogoče
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 2 skupna vzorca na leto (vsaj en vzorec v času največje sezonske proizvodnje mesnih pripravkov)	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni mogoče

Izrazi v tabeli pomenijo:

- mesni pripravki kot so določeni z Uredbo 853/2004/ES;
- vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot;
- skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

3. Pogostost vzorčenja svežega perutninskega mesa v odvisnosti od obsega proizvodnje

Letni obseg proizvodnje	Vrsta mesa glede na vrsto živali	Pogostost vzorčenja	
		Začetna pogostost vzorčenja	Zmanjšana pogostost vzorčenja (v primeru zadovoljivih rezultatov)
od 60 ton do vključno 120 ton svežega mesa	Perutnina ^(a)	Salmonella Typhimurium ^(b) , Salmonella Enteritidis : 1 vzorec enkrat na 2 tedna, da se pridobi vsaj 4 zaporedne rezultate	Salmonella Typhimurium ^(b) , Salmonella Enteritidis : 1 vzorec enkrat na mesec
od 13 ton do vključno 59 ton svežega mesa	Perutnina ^(a)	Salmonella Typhimurium ^(b) , Salmonella Enteritidis : 1 vzorec enkrat na mesec	Salmonella Typhimurium ^(b) , Salmonella Enteritidis : zmanjšanje frekvence ni mogoče
od 7 ton do vključno 12 ton svežega mesa	Perutnina ^(a)	Salmonella Typhimurium ^(b) , Salmonella Enteritidis : 1 skupni vzorec enkrat na mesec	Salmonella Typhimurium ^(b) , Salmonella Enteritidis : zmanjšanje frekvence ni mogoče
od 1,2 tone do vključno 6 ton svežega mesa	Perutnina ^(a)	Salmonella Typhimurium ^(b) , Salmonella Enteritidis : 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca	Salmonella Typhimurium ^(b) , Salmonella Enteritidis : zmanjšanje frekvence ni mogoče
manj kot 1,1 tone svežega mesa	Perutnina ^(a)	Salmonella Typhimurium ^(b) , Salmonella Enteritidis : 2 skupna vzorca na leto	Salmonella Typhimurium ^(b) , Salmonella Enteritidis : zmanjšanje frekvence ni mogoče

Izrazi v tabeli pomenijo:

- sveže meso kot je določeno z Uredbo 853/2004/ES;
- vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot;
- skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

^a To merilo o merilo se uporablja za sveže meso iz matičnih jat *Gallus gallus*, nesnic, brojlerjev ter matičnih jat puranov in jat pitovnih puranov.

^b Vključno z monofaznim sevom *Salmonella Typhimurium* 1,4,[5],12:i:- «.