

## Priloga 2

## »Priloga 3

1. Pogostost vzorčenja klavnih trupov goved, prašičev, ovac, koz in konjev <sup>(1)</sup>

| Letni obseg zakola                                            | Pogostost vzorčenja                                                              |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                               | Začetna pogostost                                                                | Zmanjšana pogostost<br>(v primeru zadovoljivih rezultatov)   |
| od 1.000 do vključno 7.000 goved oziroma konjev               | <u>Enterobakterije in SŠMO:</u><br>5 trupov na 2 tedna vsaj 2 meseca zapored     | <u>Enterobakterije in SŠMO:</u><br>5 trupov enkrat na mesec  |
|                                                               | <u>Salmonella spp.:</u><br>5 trupov na 2 tedna vsaj 2 meseca zapored             | <u>Salmonella spp.:</u><br>5 trupov enkrat na mesec          |
| od 4.000 do vključno 15.000 prašičev oziroma ovc oziroma koz  | <u>Enterobakterije in SŠMO:</u><br>5 trupov vsaka 2 meseca vsaj dvakrat zapored  | <u>Enterobakterije in SŠMO:</u><br>5 trupov vsake 3 mesece   |
|                                                               | <u>Salmonella spp.:</u><br>5 trupov vsaka 2 meseca vsaj dvakrat zapored          | <u>Salmonella spp.:</u><br>5 trupov vsake 3 mesece           |
| od 100 do vključno 999 goved oziroma konjev                   | <u>Enterobakterije in SŠMO:</u><br>5 trupov vsake 3 mesece vsaj dvakrat zapored  | <u>Enterobakterije in SŠMO:</u><br>5 trupov vsake 6 mesecev  |
|                                                               | <u>Salmonella spp.:</u><br>5 trupov vsake 3 mesece vsaj dvakrat zapored          | <u>Salmonella spp.:</u><br>5 trupov vsake 6 mesecev          |
| do vključno 99 prašičev oziroma goved oziroma ovc oziroma koz | <u>Enterobakterije in SŠMO:</u><br>5 trupov vsake 6 mesecev vsaj dvakrat zapored | <u>Enterobakterije in SŠMO:</u><br>5 trupov vsake 12 mesecev |
|                                                               | <u>Salmonella spp.:</u><br>vzorčenje ni potrebno                                 | <u>Salmonella spp.:</u><br>vzorčenje ni potrebno             |

<sup>(1)</sup> Vzorčenje je treba izvajati ločeno za vsako posamezno živalsko vrsto.

Izraz v tabeli pomeni:

- SŠMO pomeni skupno število aerobnih mikroorganizmov.

## 2. Pogostost vzorčenja klavnih trupov brojlerjev in puranov

| Letni obseg zakola                          | Pogostost vzorčenja                                                                               |                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Začetna pogostost                                                                                 | Zmanjšana pogostost<br>(v primeru zadovoljivih rezultatov)              |
| od 100.001 do vključno 1.000.000 brojlerjev | <u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.</u> :<br>5 vzorcev vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored | <u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.</u> :<br>5 vzorcev 1 x mesečno |
| od 10.001 do vključno 100.000 puranov       | <u>Salmonella spp.</u> :<br>5 vzorcev vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored                       | <u>Salmonella spp.</u> :<br>5 vzorcev 1 x mesečno                       |
| od 5.501 do vključno 100.000 brojlerjev     | <u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.</u> :<br>5 vzorcev vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored    | <u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.</u> :<br>5 vzorcev 3 x letno   |
| od 5.501 do vključno 10.000 puranov         | <u>Salmonella spp.</u> :<br>5 vzorcev vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored                          | <u>Salmonella spp.</u> :<br>5 vzorcev 3 x letno                         |
| do vključno 5.500 brojlerjev                | <u>Salmonella spp.</u> <sup>(2)</sup> :<br>5 vzorcev vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored           | <u>Salmonella spp.</u> <sup>(2)</sup> :<br>5 vzorcev 1 x letno          |
| do vključno 5.500 puranov                   | <u>Salmonella spp.</u> :<br>5 vzorcev vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored                          | <u>Salmonella spp.</u> :<br>5 vzorcev 1 x letno                         |

<sup>(2)</sup> Vzorčenja na bakterijo *Campylobacter* spp. ni treba izvajati. «.