

## Priloga 2

**ZAHTEVE ZA PARTIJE SEMENA****Del A: Sortna čistost**

1. Seme mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve glede sortne čistosti.

Preglednica 1: Najmanjša sortna čistost

| Vrsta in kategorija                                                                                             | Najmanjša sortna čistost (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Zemeljski orešek ( <i>Arachis hypogea</i> ):                                                                 |                              |
| a) osnovno seme                                                                                                 | 99,7                         |
| b) certificirano seme                                                                                           | 99,5                         |
| 2. Navadna ogrščica ( <i>Brassica napus</i> ) sorte, niso hibridne sorte in ki se uporabljajo:                  |                              |
| a) za druge namene kot za krmo:                                                                                 |                              |
| – osnovno seme                                                                                                  | 99,9                         |
| – certificirano seme                                                                                            | 99,7                         |
| b) izključno za krmo:                                                                                           |                              |
| – osnovno seme                                                                                                  | 99,7                         |
| – certificirano seme                                                                                            | 99,0                         |
| 3. Oljna repica ( <i>Brassica rapa</i> ) sorte, ki se uporabljajo:                                              |                              |
| a) za druge namene kot za krmo:                                                                                 |                              |
| – osnovno seme                                                                                                  | 99,9                         |
| – certificirano seme                                                                                            | 99,7                         |
| b) izključno za krmo:                                                                                           |                              |
| – osnovno seme                                                                                                  | 99,7                         |
| – certificirano seme                                                                                            | 99,0                         |
| 4. Navadna soja ( <i>Glycine max</i> ):                                                                         |                              |
| a) osnovno seme                                                                                                 | 99,5                         |
| b) certificirano seme                                                                                           | 99,0                         |
| 5. Sončnica ( <i>Helianthus annuus</i> ), razen hibridnih sort, vključno z njihovimi starševskimi komponentami: |                              |
| a) osnovno seme                                                                                                 | 99,7                         |
| b) certificirano seme                                                                                           | 99,0                         |
| 6. Navadni lan ( <i>Linum usitatissimum</i> ):                                                                  |                              |
| a) osnovno seme                                                                                                 | 99,7                         |
| b) certificirano seme 1. množitve                                                                               | 98,0                         |
| c) certificirano seme 2. in 3. množitve                                                                         | 97,5                         |
| 7. Vrtni mak ( <i>Papaver somniferum</i> ):                                                                     |                              |
| a) osnovno seme                                                                                                 | 99,0                         |
| b) certificirano seme                                                                                           | 98,0                         |
| 8. Bela gorjušica ( <i>Sinapis alba</i> ):                                                                      |                              |
| a) osnovno seme                                                                                                 | 99,7                         |
| b) certificirano seme                                                                                           | 99,0                         |

Najmanjša sortna čistost se preverja predvsem pri poljskih pregledih semenskih posevkov, ki se opravljajo v skladu z 18. členom tega pravilnika.

2. Seme hibridnih sort navadne ogrščice (*Brassica napus*), pridelano z uporabo moške sterilnosti, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

a) najmanjša sortna čistost semena je:

- osnovno seme, ženska starševska komponenta: 99,0 %,
- osnovno seme, moška starševska komponenta: 99,9 %,

- certificirano seme ozimnih sort navadne ogrščice: 90,0 %,
- certificirano seme jarih sort navadne ogrščice: 85,0 %;

b) seme se lahko potrdi kot certificirano seme le, če se uradno odvzeti vzorci osnovnega semena vključijo v uradno naknadno kontrolo, ki poteka sočasno s pridelavo certificiranega semena, in se na podlagi rezultatov te naknadne kontrole ugotovi, da osnovno seme izpolnjuje zahteve glede sortne čistosti iz točke a) tega odstavka in zahteve glede lastnosti starševskih komponent, predpisane za kategorijo osnovno seme v Prilogi 1 tega pravilnika, vključno z moško sterilnostjo ali obnovo fertilitnosti; sortno čistost osnovnega semena hibridov se lahko oceni z uporabo ustreznih biokemijskih metod;

c) zahteve glede najmanjše sortne čistosti certificiranega semena iz točke a) tega odstavka se preveri v naknadni kontroli, ki se opravi pri predpisanem deležu uradno odvzetih vzorcev v skladu z 31. členom tega pravilnika. Pri tem se lahko uporabijo ustrezne biokemijske metode.

3. Za sortno čistost semena vrst, ki v 1. in 2. točki te priloge niso navedene, veljajo zahteve za sortno čistost semenskega posevka na polju, kot so določene v Prilogi 1 tega pravilnika. Zahteve se preverjajo pri poljskih pregledih, ki se opravijo v skladu z določbami 13. člena tega pravilnika in 5. točko Priloge 1 tega pravilnika.



|                      |    |    |     |   |   |           |    |   |  |  |
|----------------------|----|----|-----|---|---|-----------|----|---|--|--|
| – osnovno seme       | 85 | 98 | 0,3 | - | 0 | 0 (c) (č) | 10 | 2 |  |  |
| – certificirano seme | 85 | 98 | 0,3 | - | 0 | 0 (c) (č) | 10 | 5 |  |  |

Opombe:

- (a) največja dovoljena vsebnost semena, navedena v stolpcu 5, vključuje tudi semena iz stolpcev 6 do 11;
- (b) določanje skupne vsebnosti semen drugih rastlinskih vrst ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 5;
- (c) določanje števila semen predenice (*Cuscuta* spp.) ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 7;
- (č) prisotnost enega semena predenice (*Cuscuta* spp.) v vzorcu predpisane mase se ne šteje kot nečistota, če je drugi vzorec enake velikosti brez semena predenice (*Cuscuta* spp.);
- (d) seme ne sme vsebovati semena pojalknika (*Orobancha* spp.), vendar se prisotnost enega semena pojalknika (*Orobancha* spp.) v vzorcu 100 g semena ne šteje kot nečistota, če drugi vzorec velikosti 200 g semena ne vsebuje nobenega semena pojalknika (*Orobancha* spp.);
- (-) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti.

**Del C: Zahteve glede zdravstvenega stanja semena**

Seme oljnic in predivnic mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.

Seme oljnic in predivnic mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, določene v Uredbi 2016/2031/EU.

Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora seme navedenih vrst oljnic in predivnic, izpolnjevati tudi zahteve glede prisotnosti škodljivih organizmov ali njihovih simptomov, določenih v Preglednici 3 tega dela priloge.

Preglednica 3: Dovoljeni pragovi prisotnosti škodljivih organizmov in najmanjša velikost vzorca semena za testiranje na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov

| <b>Glive in oomicete</b>                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                             | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                 |
| Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih ti povzročajo                         | Rastline za saditev (rod ali vrsta)           | Dovoljeni pragovi prisotnosti škodljivih organizmov ali simptomov v ali na semenu kategorije predosnovno, osnovno in certificirano seme              | Najmanjša velikost vzorca semena za laboratorijsko testiranje glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov |
| <i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]                                                      | <i>Linum usitatissimum</i> L.                 | 5 %;<br>5 % okuženih z <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> in <i>Fusarium</i> spp. | 150 g                                                                                                                             |
| <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] | <i>Linum usitatissimum</i> L. – lan za vlakna | 1 %;<br>5 % okuženih z <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> in <i>Fusarium</i> spp. | 150 g                                                                                                                             |
|                                                                                                          | <i>Linum usitatissimum</i> L. – lan za seme   | 5 %;<br>5 % okuženih z <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> in <i>Fusarium</i> spp. | 150 g                                                                                                                             |
| <i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]                                                                 | <i>Helianthus annuus</i> L.                   | 5 %                                                                                                                                                  | 400 semen                                                                                                                         |
|                                                                                                          | <i>Linum usitatissimum</i> L.                 |                                                                                                                                                      | 400 semen                                                                                                                         |
| <i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]                                                           | <i>Linum usitatissimum</i> L.                 | 5 %;<br>5 % okuženih z <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> in <i>Fusarium</i> spp. | 150 g                                                                                                                             |
| <i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]          | <i>Glycine max</i> (L.) Merr.                 | 15 % za okužbo s <i>Phomopsis</i> complex                                                                                                            | 400 semen                                                                                                                         |
| <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]                                           |                                               |                                                                                                                                                      | 400 semen                                                                                                                         |
| <i>Fusarium</i>                                                                                          | <i>Linum</i>                                  | 5 %;                                                                                                                                                 | 150 g                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (anamorfni rod)<br>Link [1FUSAG],<br>razen <i>Fusarium</i><br><i>oxysporum</i> f. sp.<br><i>albedinis</i> (Kill. &<br>Maire) W.L. Gordon<br>[FUSAAL] in<br><i>Fusarium</i><br><i>circinatum</i><br>Nirenberg &<br>O'Donnell [GIBBCI] | <i>usitatissimum</i> L.                                            | 5 % okuženih z<br><i>Alternaria linicola</i> ,<br><i>Boeremia exigua</i> var.<br><i>linicola</i> , <i>Colletotrichum</i><br><i>lini</i> in <i>Fusarium</i> spp.                                            |            |
| <i>Plasmopara</i><br><i>halstedii</i> (Farlow)<br>Berlese & de Toni<br>[PLASHA]                                                                                                                                                      | <i>Helianthus</i><br><i>annuus</i> L.                              | 0 %                                                                                                                                                                                                        | 1200 semen |
| <i>Sclerotinia</i><br><i>sclerotiorum</i> (Libert)<br>de Bary [SCLESC]                                                                                                                                                               | <i>Brassica rapa</i> L.<br>var. <i>silvestris</i><br>(Lam.) Briggs | V laboratorijski preiskavi<br>reprezentativnega<br>vzorca partije semena,<br>določenega v stolpcu 4<br>Priloge 3 tega pravilnika,<br>je lahko odkritih največ 5<br>sklerocijev ali delcev<br>sklerocijev.  | 70 g       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Sinapis alba</i> L.                                             |                                                                                                                                                                                                            | 200 g      |
| <i>Sclerotinia</i><br><i>sclerotiorum</i> (Libert)<br>de Bary [SCLESC]                                                                                                                                                               | <i>Brassica napus</i><br>L. (partim)                               | V laboratorijski preiskavi<br>reprezentativnega<br>vzorca partije semena,<br>določenega v stolpcu 4<br>Priloge 3 tega pravilnika,<br>je lahko odkritih največ<br>10 sklerocijev ali delcev<br>sklerocijev. | 100 g      |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Helianthus</i><br><i>annuus</i> L.                              |                                                                                                                                                                                                            | 1000 g     |