

Priloga

Seznam bolezni, okužb z virusom hepatitisa C in HIV ter krajših obdobj za uveljavljanje pravice do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov

I

Vrsta raka	Histološki tip in stadij raka ob postavitvi diagnoze	Obdobje od konca aktivnega zdravljenja raka, brez ponovitve raka
Germinalni tumorji	RAK TESTISA: – Seminomski in neseminomski tumorji, stadij I	3 leta
	– Seminomski in neseminomski tumorji, stadij II-III	5 let
	IZVENTESTIKULARNI GERMINALNI TUMORJI	5 let
Maligni limfomi	Difuzni velikocelični limfomi B, vsi podtipi, vsi stadiji	5 let
	Primarni mediastinalni velikocelični, limfom B, vsi stadiji	5 let
	Vsi podtipi klasičnega Hodgkinovega limfoma in Hodgkinov limfom tipa nodularne limfocitne predominance, vsi stadiji	5 let
Raki otorinolaringološkega (ORL) področja	Ploščatocelični in žlezni raki ORL področja, razen:	5 let
	– adenoidnocistični karcinom	7 let
	– karcinom nazofarinksa	7 let
	– olfaktorni nevroblastom	7 let
Ginekološki raki	RAK MATERNIČNEGA VRATU: – CIN III (ali HSIL) ali in situ*	0 let
	– FIGO stadij 1A1	3 leta
	– Ostali stadiji	5 let
	DRUGI GINEKOLOŠKI RAKI	5 let
Rak kože	MALIGNI MELANOM: – Stadij Tis*	0 let
	– Stadij IA in IB	2 leti
	– Stadij IIA in IIIA	5 let
	BAZALNOCELIČNI KARCINOM: – Stadij Tis*	0 let
	– Stadij I in II	2 leti
	– Stadij III	5 let

	PLOŠČATOCELIČNI KARCINOM:	
	– Stadij Tis*	0 let
	– Stadij I	2 leti
	– Stadij II	5 let
Rak ščitnice	Papilarni in folikularni rak <55 let, stadij I	2 leti
	Papilarni in folikularni rak 55 let ali več, stadij I ali II	2 leti
	Papilarni in folikularni rak, stadij III	5 let
Rak urotrakta	Nizkorizični rak prostate se obravnava enako kot oseba, ki nikoli ni zbolela za rakom, ker je priporočen pristop aktivno sledenje in ne aktivno zdravljenje.	0 let (tj. se ne obravnava kot rak)
	Rak ledvic	5 let
	Raki ledvičnega meha in sečevodov	5 let
	Rak penisa	5 let
	Rak prostate z izjemo nizkorizičnega raka prostate	5 let
	Rak sečnega mehurja	5 let
	Rak sečnice	5 let
Rak dojke	– DCIS in LCIS*	0 let
	– Stadij I	1 leto
	– Stadij II do III	5 let
Rak centralnega živčnega sistema	Nizko maligni oziroma benigni možganski tumorji (švanom, meningeom, kraniofaringeom, adenom hipofize, pilocitni astroцитom, cirkumskriptni gliom)	2 leti
Sarkomi	T1-4 N0 M0, Gradus 1	5 let
Rak pri otrocih in mladih odraslih do starosti 21. leta ob postavitvi diagnoze	Vse vrste raka in vsi stadiji, razen če ni v prejšnjih vrsticah v tej tabeli določeno krajše obdobje	5 let

Za rake, histološke tipe in stadije raka, ki niso vključeni v ta seznam, velja obdobje sedem let od konca aktivnega zdravljenja v skladu z zakonom, ki ureja pravico oseb po prebolelem raku in določenih drugih boleznih do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov.

Za rake, kjer v tem seznamu ni navedenega stadija bolezni, to pomeni, da krajše obdobje velja le za rakave bolezni brez oddaljenih zasevkov.

* Gre za predrakave spremembe ali neinvazivne rake.

II

Okužba z virusom HIV	Drug, strokovno utemeljen medicinski pogoj	Obdobje od začetka aktivnega zdravljenja okužbe z virusom HIV
----------------------	--	---

Okužba z virusom HIV	Nezaznaven virus HIV v krvi	Zaporednih 6 mesecev, kadarkoli od začetka zdravljenja, v okviru enega leta zdravljenja
-----------------------------	-----------------------------	---

III

Seznam bolezni, okužb z virusom hepatitisa C in HIV ter krajših obdobj za uveljavljanje pravice do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov so potrdili pristojni razširjeni strokovni kolegiji, in sicer:

1. Razširjeni strokovni kolegij za onkologijo za vrste raka (sklep 3. redne seje z dne 16. 6. 2025),
2. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo za vrste raka pri otrocih in mladih odraslih do starosti 21. leta ob postavitvi diagnoze (sklep št. 12/10 z dne 27. 5. 2025) in
3. Razširjeni strokovni kolegij za infektologijo za drug, strokovno utemeljen medicinski pogoj za okužbo z virusom HIV (sklep št. 1 dopisne seje z dne 13. 6. 2025).