

PRILOGA 4:

»Priloga 6: Zdravstvena stanja in drugi pogoji za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz skupine 6. medicinski pripomočki za dihanje	
MEDICINSKI PRIPOMOČKI	ZDRAVSTVENA STANJA IN DRUGI POGOJI
Podskupine	
I. Medicinski pripomočki za vzdrževanje pozitivnega tlaka	
APARAT ZA VZDRŽEVANJE STALNEGA PRITISKA V DIHALNIH POTEH (CPAP)	Zavarovana oseba, ki ima: – OSAS¹, diferenciran glede na ICSD-3² kriterije, – CSAS³ zaradi Cheyne-Stokesovega dihanja, definiran z ICSD-3 kriterijem, kot terapija prvega izbora, – drugi kronični CSAS, definirani z ICSD-3 kriterijem, kot terapija prvega izbora ali – OHS⁴, definiran z ICSD-3 kriterijem, če s CPAP odpravimo apneje/hipopneje, dosežemo stabilno saturacijo s kisikom v krvi $\geq 90\%$ ter dosežemo normalizacijo jutranjega pCO₂.
APARAT ZA PODPORO DIHANJU S POZITIVNIM TLAKOM OB VDIHU IN IZDIHU (BIPAP)	Zavarovana oseba z OSAS³, ki je nezadovoljivo zdravljena s CPAP-om s potrebo po zelo visokih pritiskih (> 15 cm H₂O) ali pri intoleranci CPAP-a. Pri zavarovani osebi: – z OHS⁶, definiranim z ICSD-3⁴, ki je nezadovoljivo zdravljen z visokim CPAP (> 15 cm H₂O), to je z vztrajajočo hipoksemijo s saturacijo s kisikom v krvi $< 90\%$ ali perzistentnimi apnejami/hipopnejami ali vztrajno hiperkapnijo v budnosti, – z nočno hipoventilacijo, dokazano s kapnografijo (alternativno s PAAK iz arterijske linije), če je porast pCO₂ preko 7,3 kPa za ≥ 10 min, ali če pCO₂ poraste za $\geq 1,33$ kPa med spanjem glede na stanje v budnosti in preseže 6,7 kPa za ≥ 10 min, – z drugimi sindromi hipoventilacije, definiranimi z ICSD-3 (KOPB, kifoskolioza, živčno-mišične bolezni, hipoventilacija zaradi zdravil/substanc in podobnih stanj), kjer ni potrebe po > 16 h/dan ventilatorni podpori in življenje bolnika ni odvisno od ventilatorja ali – s kroničnim CSAS⁵, ki vztraja kljub ročni CPAP titraciji in optimizaciji terapije osnovne bolezni, dokazanim s polisomnografijo.
APARAT ZA PODPORO DIHANJU S POZITIVNIM TLAKOM OB VDIHU IN IZDIHU (BIPAP) – ZELO ZAHTEVEN	Zavarovana oseba s: – CSAS⁵, ki vztraja kljub ročni titraciji s CPAP ali z BIPAP – zahtevnim in optimizaciji terapije osnovne bolezni, dokazanim s polisomnografijo ali – CSAS, ki se pojavijo zaradi CPAP ali BIPAP terapije in vztrajajo še tri mesece po uvedbi CPAP ali BIPAP.
VENTILATOR – APARAT ZA UMETNO PREDIHAVANJE PLJUČ	Zavarovana oseba s stabilno kronično respiracijsko insuficienco v okviru kronične obstruktivne

PRILOGA 4:

	pljučne bolezni (KOPB) ali živčno-mišične bolezni z oslabelostjo dihalnih mišic, stara vsaj 18 let, ki ji je zagotovljena trajna nega na domu s potrebo po celodnevni asistirani ventilaciji. Zavarovana oseba s kronično dihalno odpovedjo, mlajša od 18 let, ki ji je zagotovljena trajna nega na domu s potrebo po asistirani ventilaciji.
DIHALNI BALON	Zavarovana oseba, ki se na domu zdravi zaradi kronične dihalne odpovedi, ima trajno traheostomo, je trajno odvisna od mehanične ventilacije pljuč in je oseba, ki zanjo skrbi, usposobljena za uporabo dihalnega balona ter če: – bi morebitna okvara aparata za mehanično predihavanje pljuč zahtevala takojšnje izvajanje temeljnih postopkov oživljanja ali – je dihalni balon potreben za nego traheostome in toaleta spodnjih dihalnih poti. Zavarovana oseba, mlajša od pet let, z boleznijo pljuč in traheostomo, če je oseba, ki zanjo skrbi na domu, usposobljena za uporabo dihalnega balona.
II. Medicinski pripomočki za čiščenje dihalnih poti	
ELEKTRIČNI MASATOR PLJUČ	Zavarovana oseba, ki se zdravi zaradi kronične gnojne pljučne bolezni v okviru cistične fibroze.
ASPIRATOR	Nezmožnost izkašljevanja pri zavarovani osebi, ki ji je zagotovljena trajna nega na domu.
PRENOSNI ASPIRATOR	Otrok, ki ima trajno traheostomo, nosi endotrahealno kanilo in potrebuje večje število aspiracij dnevno. Zavarovana oseba, ki potrebuje več kot tri aspiracije dnevno, je vezana na invalidski voziček in ji prenosni aspirator zagotavlja samostojno gibanje.
ASPIRACIJSKI KATETER	Uporaba aspiratorja pri negi na domu.
MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA IZKAŠLJEVANJE Z OSCILIRAJOČO PEEP VALVULO	Zavarovana oseba, mlajša od 18 let, ali zavarovana oseba, stara vsaj 18 let, ki je zbolela pred 18. letom starosti in se zdravi tudi v odrasli dobi, pri: – kronični gnojni pljučni bolezni, – bronhiektazijah, – primarni ciliarni diskineziji ali – traheomalaciji ali bronhomalaciji. Zavarovana oseba s kronično pljučno boleznijo, s kroničnim produktivnim kašljem, ki traja več kot 6 tednov, in oteženim izkašljevanjem.
MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA VZDRŽEVANJE POZITIVNEGA TLAKA MED IZDIHOM (PEEP VALVULA) Z MASKO	Zavarovana oseba, ki zaradi svoje starosti (otrok) ali spremljajočih prizadetosti ne more učinkovito uporabljati medicinskega pripomočka za izkašljevanje z oscilirajočo PEEP valvulo in se zdravi zaradi: – kronične gnojne pljučne bolezni, – bronhiektazij, – akutne ali kronične atelektaze pljuč ali – traheomalacije ali bronhomalacije.
MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA VZDRŽEVANJE POZITIVNEGA TLAKA MED IZDIHOM (PEEP VALVULA) Z USTNIKOM	Zavarovana oseba s kolapsom intratorakalnih dihalnih poti ali trajno nepredihanostjo dela pljuč.

PRILOGA 4:

IZKAŠLJEVALNIK	Zavarovana oseba ima pravico do izkašljevalnika, če zaradi poškodbe ali okvare živčevja, živčno-mišične bolezni ali pljučne bolezni ne izkašljeuje učinkovito, ima pa produktiven kašelj in uporaba drugih medicinskih pripomočkov za izkašljevanje ni učinkovita, pri čemer meritev maksimalnega pretoka zraka pri kašljanju znaša manj kot 270 l/min (PEFR-peak expiratory flow rate) ali ima simptome in znake neučinkovitega kašlja in so ji zagotovljeni pogoji za redno čiščenje spodnjih dihalnih poti na domu z izkašljevalnikom.
OBRAZNA MASKA ZA IZKAŠLJEVALNIK	Zavarovana oseba, mlajša od 18 let, ima pravico do izkašljevalnika, če je klinično dokazano, da je kašelj neučinkovit zaradi živčno-mišične bolezni ali zaradi drugih bolezni.
USTNIK ZA IZKAŠLJEVALNIK	Zavarovana oseba, ki redno izvaja čiščenje spodnjih dihal z izkašljevalnikom, ima pravico do obrazne maske za izkašljevalnik.
NASTAVEK ZA KANILO ZA IZKAŠLJEVALNIK	Zavarovana oseba, ki redno izvaja čiščenje spodnjih dihal z izkašljevalnikom, ima pravico do ustnika za izkašljevalnik.
FILTER ZA IZKAŠLJEVALNIK	Zavarovana oseba, ki redno izvaja čiščenje spodnjih dihal z izkašljevalnikom preko endotrahealne kanile, ima pravico do nastavka za kanilo za izkašljevalnik.
CEV ZA IZKAŠLJEVALNIK	Zavarovana oseba, ki redno izvaja čiščenje spodnjih dihal z izkašljevalnikom, ima pravico do filtra za izkašljevalnik.
III. Medicinski pripomočki za zdravljenje in spremljanje	
PULZNI OKSIMETER Z ALARMOM	Zavarovana oseba, mlajša od 18 let, ki se zdravi s kisikom na domu zaradi kronične dihalne odpovedi v okviru napredovane oblike cistične fibroze, intersticijske pljučne bolezni s hipoksemijo, pljučne arterijske hipertenzije, bronhopulmonalne displazije, obliterantnega bronholitisa ali zavarovana oseba, stara vsaj 18 let, pri kateri se zdravljenje navedenega stanja neprekinjeno nadaljuje iz obdobja pred 18. letom starosti.
SENZORJI ZA PULZNI OKSIMETER ZA VEČKRATNO UPORABO	Zavarovana oseba pri zdravljenju z ventilatorjem – aparatom za umetno predihavanje pljuč na domu.
SENZORJI ZA PULZNI OKSIMETER ZA LEPLJENJE NA KOŽO	Zavarovana oseba, ki ima pravico do pulznega oksimetra.
INHALATOR	Zavarovana oseba, mlajša od treh let, s pravico do pulznega oksimetra. Zavarovana oseba, ki ima pravico do pulznega oksimetra, pri kateri zaradi razvojnih posebnosti ni možen drugačen način merjenja saturacije.
INHALATOR S FUNKCIJO UPORA PRI IZDIHU	KOPB s FEV manj kot 50 % referenčne vrednosti. Mukoviscidoza. Laringektomirana oseba. Trajna traheostoma. Težja oblika laringitisa.
INHALATOR ZA PRILAGODLJIVO DOVAJANJE RAZPRŠIL	Zavarovana oseba s cistično fibrozo ali drugimi stanji, ki so sorodna tej bolezni, pri katerih je treba vsaj dvakrat dnevno aplicirati hipertonično raztopino NaCl in ob poslabšanjih inhalacije različnih antibiotikov.
	Zavarovana oseba s cistično fibrozo, pri kateri je potrebno vsaj dvakrat dnevno aplicirati hipertonično raztopino NaCl in ob poslabšanjih inhalacije različnih antibiotikov.

PRILOGA 4:

FILTER NA IZDIHU ZA INHALATOR	Zavarovana oseba, ki ji je predpisan antibiotik za aplikacijo v obliki inhalacij in uporablja inhalator za prilagodljivo odmerjanje razpršil ali inhalator s funkcijo upora pri izdihu.
NASTAVEK ZA FILTER NA IZDIHU ZA INHALATOR	Zavarovana oseba, ki ji je predpisan antibiotik za aplikacijo v obliki inhalacij in uporablja inhalator za prilagodljivo odmerjanje razpršil ali inhalator s funkcijo upora pri izdihu.
MASKA ZA INHALATOR	Zavarovana oseba, ki je prejela inhalator s funkcijo upora pri izdihu ali inhalator za prilagodljivo odmerjanje razpršil, ima pravico do maske za inhalator.
USTNIK ZA INHALATOR	Zavarovana oseba, ki je prejela inhalator s funkcijo upora pri izdihu ali inhalator za prilagodljivo odmerjanje razpršil, ima pravico do ustnika za inhalator.
RAZPRŠILNA POSODICA ZA INHALATOR	Zavarovana oseba, ki je prejela inhalator s funkcijo upora pri izdihu, ima pravico do razpršilne posodice za inhalator.
POVEZOVALNA CEV ZA INHALATOR	Zavarovana oseba, ki je prejela inhalator s funkcijo upora pri izdihu, ima pravico do povezovalne cevi za inhalator.
POSODICA Z RAZPRŠILNO MEMBRANO ZA INHALATOR	Zavarovana oseba, ki je prejela inhalator za prilagodljivo odmerjanje razpršil, ima pravico do posodice z razpršilno membrano za inhalator.
RAZPRŠILNA MEMBRANA ZA INHALATOR	Zavarovana oseba, ki je prejela inhalator za prilagodljivo odmerjanje razpršil, ima pravico do razpršilne membrane za inhalator.
POVEZOVALNI KABEL ZA INHALATOR	Zavarovana oseba, ki je prejela inhalator za prilagodljivo odmerjanje razpršil, ima pravico do povezovalnega kabla za inhalator.
SET POTROŠNIH MATERIALOV ZA INHALATOR	Zavarovana oseba, ki je prejela inhalator, ima pravico do seta potrošnih materialov za inhalator, ki vključuje masko ali ustnik, razpršilno posodico in povezovalno cev.
RAZTOPINA 3 % NATRIJEVEGA KLORIDA ZA INHALIRANJE, PO 4 – 5 ml	Zavarovana oseba s cistično fibrozo ali cistični fibrozi sorodnim stanjem, ki potrebuje hidracijo s hipertonično raztopino za odstranjevanje sluzi iz dihalnih poti.
RAZTOPINA 6 % NATRIJEVEGA KLORIDA ZA INHALIRANJE, PO 4 – 5 ml	Zavarovana oseba s cistično fibrozo ali cistični fibrozi sorodnim stanjem, ki potrebuje hidracijo s hipertonično raztopino za odstranjevanje sluzi iz dihalnih poti.
MERILEC PRETOKA ZRAKA	Bronhialna astma s stalnimi dihalnimi težavami.
NASTAVEK Z MASKO ZA DAJANJE ZDRAVILA	Bronhialna astma ali mukoviscidoza pri otrocih, starih do 15 let in nezmožnosti uporabe ustnika na razpršilu.
PODALIŠEK ZA USTNIK ZA DAJANJE ZDRAVILA	Bronhialna astma ali mukoviscidoza pri otrocih, starih do 15 let in nezmožnosti uporabe ustnika na razpršilu.
IV. Medicinski pripomočki za dovajanje kisika	
KONCENTRATOR KISIKA – stacionarni	Zavarovana oseba je upravičena do medicinskega pripomočka za največ za tri mesece: – pri akutni respiratorni boleznii ali poslabšanju kronične respiratorne bolezni, ki potrebuje hospitalizacijo in ob tem zdravljenje s kisikom, – ob izpolnjevanju drugih kriterijev za odpust iz bolnišnice obstaja potreba po dodanem kisiku (hipoksemija s pO₂ v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti prisotna pljučna hipertenzija ali hematokrit ≥ 56 %),

PRILOGA 4:

	– po treh mesecih se oceni stabilnost kronične bolezni ali ozdravitev akutne bolezni ali potrdi diagnoza pljučne bolezni ter preveri kriterije za predpis koncentracije kisika do največ 12 mesecev, – na podlagi plinske analize arterijske krvi se določi pretok kisika v l/min. Zavarovana oseba je upravičena do medicinskega pripomočka za največ 60 mesecev: – pri stabilni dolgotrajni respiratorni bolezni, – s stalno hipoksemijo, ki ima pO₂ v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa (izmerjeno vsaj 3 mesece po akutnem poslabšanju pljučne bolezni), – pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzija ali pa je hematokrit $\geq 56\%$, – na podlagi plinske analize arterijske krvi se določi pretok kisika v l/min. Zavarovana oseba, mlajša od 15 let, ima pri dolgotrajni respiratorni bolezni s stalno hipoksemijo pravico do zdravljenja za največ 60 mesecev.
KONCENTRATOR KISIKA – stacionarni in prenosni	Zavarovana oseba ima pravico do medicinskega pripomočka za največ za tri mesece pri: – akutni respiratorni bolezni ali poslabšanju kronične respiratorne bolezni, ki potrebuje hospitalizacijo in ob tem zdravljenje s kisikom, – ob izpolnjevanju drugih kriterijev za odpust iz bolnišnice obstaja potreba po dodanem kisiku (hipoksemija s pO₂ v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti prisotna pljučna hipertenzija ali hematokrit $\geq 56\%$), – po treh mesecih se oceni stabilnost kronične bolezni ali ozdravitev akutne bolezni ali potrdi diagnoza pljučne bolezni ter preveri kriterije za predpis koncentracije kisika stacionarnega in prenosnega ali tekočega kisika do vključno 5 litrov na minuto do največ 12 mesecev, – na podlagi plinske analize arterijske krvi se določi pretok kisika v l/min. Zavarovana oseba ima pravico do medicinskega pripomočka za največ 24 mesecev pri: – stabilni dolgotrajni respiratorni bolezni, – s stalno hipoksemijo, ki ima pO₂ v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa (izmerjeno vsaj 3 mesece po akutnem poslabšanju pljučne bolezni), – pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzija ali je hematokrit $\geq 56\%$, – če ima tak kognitivni in telesni upad, ki bi ji onemogočal hojo po ravnam na razdalji večji kot 150 m izven stanovanja in socialno udejstvovanje izven stanovanja, – telesni upad se preveri s 6-minutnim testom hoje (kjer oseba prehodi najmanj 150

PRILOGA 4:

	metrov), ali z enominutnim testom vstajanja s stola (kjer v minuti izmerimo najmanj 8 vstajanj s stola), – preverjanje telesnega upada se lahko izvede z dodanim kisikom, ki mora korigirati vrednosti pO₂ v krvi nad omenjene mejne vrednosti (v PAAK) ali nad 85 % saturacije s kisikom med testom, – na podlagi plinske analize arterijske krvi se določi pretok kisika v l/min, razen med naporom, ko zadošča meritev saturacije s kisikom. Zavarovana oseba, mlajša od 15 let, ima pri dolgotrajni respiratorni boleznih s stalno hipoksemijo pravico do zdravljenja za 24 mesecev.
SISTEM ZA UPORABO KISIŠKOVJE JEKLENKE	Zavarovana oseba je upravičena do medicinskega pripomočka za največ za tri mesece pri: – akutni respiratorni boleznih ali poslabšanju kronične respiratorne bolezni, ki potrebuje hospitalizacijo in ob tem zdravljenje s kisikom, – ob izpolnjevanju drugih kriterijev za odpust iz bolnišnice obstaja potreba po dodanem kisiku (hipoksemija s pO₂ v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti prisotna pljučna hipertenzija ali hematokrit ≥ 56 %), – po treh mesecih se oceni stabilnost kronične bolezni ali ozdravitev akutne bolezni ali potrdi diagnoza pljučne bolezni ter preveri kriterije za predpis koncentracije kisika stacionarnega in prenosnega ali tekočega kisika do vključno 5 litrov na minuto do največ 12 mesecev, – na podlagi plinske analize arterijske krvi se določi pretok kisika v l/min. Zavarovana oseba je upravičena do medicinskega pripomočka za največ 24 mesecev pri: – stabilni dolgotrajni respiratorni boleznih – s stalno hipoksemijo, ki ima pO₂ v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa (izmerjeno vsaj 3 mesece po akutnem poslabšanju pljučne bolezni), – pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzija ali pa je hematokrit ≥ 56 %. – če ima tak kognitivni in telesni upad, ki bi ji onemogočal hojo po ravnam na razdalji večji kot 150 m izven stanovanja in socialno udejstvovanje izven stanovanja – telesni upad se preveri s 6-minutnim testom hoje (kjer oseba prehodí najmanj 150 metrov), ali z enominutnim testom vstajanja s stola (kjer v minuti izmerimo najmanj 8 vstajanj s stola) – preverjanje telesnega upada se lahko izvede z dodanim kisikom, ki mora korigirati vrednosti pO₂ v krvi nad omenjene mejne vrednosti (v PAAK) ali nad 85 % saturacije s

PRILOGA 4:

	kisikom med testom. – na podlagi plinske analize arterijske krvi se določi pretok kisika v l/min, razen med naporom, ko zadošča meritev saturacije s kisikom. Zavarovana oseba, mlajša od 15 let, ima pri dolgotrajni respiratorni bolezni s stalno hipoksemijo pravico do zdravljenja za 24 mesecev. Zavarovana oseba s Hortonovim glavobolom – s ponavljajočimi se hudimi glavoboli najvišje intenzitete na bolečinski lestvici v obdobju klastrske epizode, če se z učinkom kisikove terapije preprečijo hudi glavoboli, zavarovana oseba pa je sposobna samokontrole med aplikacijo terapije. Zavarovana oseba je upravičena do medicinskega pripomočka za največ za tri mesece pri: – akutni respiratorni bolezni ali poslabšanju kronične respiratorne bolezni, ki potrebuje hospitalizacijo in ob tem zdravljenje s kisikom, – ob izpolnjevanju drugih kriterijev za odpust iz bolnišnice obstaja potreba po dodanem kisiku (hipoksemija s pO₂ v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti prisotna pljučna hipertenzija ali hematokrit $\geq 56\%$), – po treh mesecih se oceni stabilnost kronične bolezni ali ozdravitev akutne bolezni ali potrdi diagnozo pljučne bolezni ter preveri kriterije za predpis koncentracije kisika stacionarnega in prenosnega ali tekočega kisika do vključno 5 litrov na minuto do največ 12 mesecev, – na podlagi plinske analize arterijske krvi se določi pretok kisika v l/min. Zavarovana oseba je upravičena do medicinskega pripomočka za največ 24 mesecev pri: – stabilni dolgotrajni respiratorni bolezni – s stalno hipoksemijo, ki ima pO₂ v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa (izmerjeno vsaj 3 mesece po akutnem poslabšanju pljučne bolezni), – pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzija ali pa je hematokrit $\geq 56\%$. – če ima tak kognitivni in telesni upad, ki bi ji onemogočal hojo po ravnam na razdalji večji kot 150 m izven stanovanja in socialno udejstvovanje izven stanovanja – telesni upad se preveri s 6-minutnim testom hoje (kjer oseba prehodi najmanj 150 metrov), ali z enominutnim testom vstajanja s stola (kjer v minuti izmerimo najmanj 8 vstajanj s stola) – preverjanje telesnega upada se lahko izvede z dodanim kisikom, ki mora korigirati vrednosti pO₂ v krvi nad omenjene mejne vrednosti (v PAAK) ali nad 85 % saturacije s kisikom med testom.
SISTEM ZA DOVAJANJE TEKOČEGA KISIKA DO VKLJUČNO 5 l/min	

PRILOGA 4:

	– na podlagi plinske analize arterijske krvi se določi pretok kisika v l/min, razen med naporom, ko zadošča meritev saturacije s kisikom. Zavarovana oseba, mlajša od 15 let, ima pri dolgotrajni respiratorni bolezní s stalno hipoksemijo pravico do zdravljenja za 24 mesecev.
SISTEM ZA DOVAJANJE TEKOČEGA KISIKA NAD 5 l/min	Zavarovana oseba je upravičena do medicinskega pripomočka za 12 mesecev: – pri stabilni dolgotrajni respiratorni bolezní s tako stalno hipoksemijo, ki ima pO₂ v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa (izmerjeno vsaj 3 mesece po akutnem poslabšanju pljučne bolezni), – pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzija ali pa je hematokrit $\geq 56\%$, – dodatek kisika nad 5 l/min mora korigirati vrednosti pO₂ v krvi nad omenjene mejne vrednosti, – potrebuje v mirovanju pretok manj kot 5 l/min, med naporom (6-minutni test hoje) pa pomembno desaturira in za vzdrževanje saturacije s kisikom nad 85 % potrebuje pretoke kisika nad 5 l/min, – na podlagi plinske analize arterijske krvi se določi pretok kisika v l/min, razen med naporom, ko zadošča meritev saturacije s kisikom. Zavarovana oseba, mlajša od 15 let, ima pri dolgotrajni respiratorni bolezní s stalno hipoksemijo, če potrebuje odmerke kisika, večje od 5 litrov na minuto, pravico do zdravljenja za 24 mesecev.
KATETER ZA DOVAJANJE KISIKA – NAZALNI	Trajno zdravljenje s kisikom na domu.
KATETER ZA DOVAJANJE KISIKA – BINAZALNI	Trajno zdravljenje s kisikom na domu.
KATETER ZA DOVAJANJE KISIKA ZA OTROKE DO PETIH LET	Trajno zdravljenje s kisikom na domu pri otroku do petega leta starosti.

Pojasnilo izrazov:

1 OSAS je sindrom obstruktivne apneje v spanju (obstruktivna apneja v spanju).

2 ICSD-3 je mednarodna klasifikacija motenj spanja.

3 CSAS je sindrom centralne apneje v spanju (primarne, zaradi druge bolezni ali zaradi zdravil/substanc).

4 OHS je sindrom hipoventilacije zaradi debelosti (BMI 30 ali več).«.