

Priloga 1: Opredelitev primera BTV

1. Sum na BTV

Pri živali se lahko posumi na prisotnost BTV, če se pojavi kateri od naslednjih kliničnih znakov:

- povišana temperatura;
- izcedek iz smrčka in slinjenje, kasneje slina postane penasta;
- pordeli smrček in očesne veznice, pojavijo se otekline sluznice ustnic, dlesni, brezzobe plošče in jezika, razjede po smrčku in ustni votlini, včasih tudi po vimenu;
- padec mlečnosti, mastitis;
- oteženo gibanje živali, otečen in pordel svitkov rob;
- težave v reprodukciji;
- pogin.

Znaki so najizrazitejši pri ovcah. Pri govedu bolezen običajno poteka v blažji obliki, lahko pa tudi brez opaznih znakov.

Sum na BTV se postavi na podlagi kliničnih znakov v povezavi z rezultati epidemiološke poizvedbe in anamnestičnimi podatki, vključno z rezultati entomološkega nadzora.

BTV ni mogoče potrditi samo na podlagi kliničnih znakov, razen ko je prisotnost BTV oziroma kroženje BTV na določenem geografskem območju že potrjena.

2. Potrjen primer BTV

Preiskave za laboratorijsko potrditev BTV so določene v Poglavju 3.1.3 diagnostičnega priročnika Svetovne organizacije za zdravje živali (v nadaljnjem besedilu: WOAH), ki je dostopen na spletni strani v angleškem jeziku: <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-%20and-manuals/> in v protokolih referenčnega laboratorija EU za BTV (v nadaljnjem besedilu: EURL), ki so dostopni na spletni strani EURL v angleškem jeziku: <https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios-sanidad-genetica/referencia-ue/diagnostico/diagnostico--lengua-azul> oziroma v protokolih nacionalnega referenčnega laboratorija za BTV.

Pri potrjevanju BTV se upoštevajo pogoji iz 77. člena Uredbe 2016/429/EU glede rezultatov kliničnih in laboratorijskih preiskav, epidemiološke poizvedbe in drugih razpoložljivih epidemioloških podatkov ter 9. člena Delegirane uredbe 2020/689/EU.