

Priloga 2: Odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave

1. Ob prvem sumu na BTV v obratu veterinar odvzame živalim, ki kažejo klinične znake BTV, vendar ne več kot petim živalim v istem obratu, naslednje vzorce za laboratorijsko preiskavo:
 - ena epruveta krvi brez dodatkov (serološka epruveta);
 - ena epruveta krvi z dodatkom antikoagulant EDTA in
 - bris izcedkov (po potrebi).
 2. Če je žival, ki je kazala klinične znake, na podlagi katerih je bil postavljen sum na BTV, poginila, veterinar pošlje truplo poginule živali, vendar ne več kot tri poginule živali na obrat, na sekcijo in nadaljnje preiskave za potrditev BTV.
 3. Veterinar odvzem vzorcev vnese v informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali – EPI in izbere namen – »Drugo – sum bolezni«, plačnik »Proračun«.
 4. Pri vseh živalih, ki se vzorčijo zaradi suma na BTV, je treba diferencialno diagnostično izključiti prisotnost slinavke in parkljevke (v nadaljnjem besedilu: SIP) in okužbe z virusom epizootske hemoragične bolezni (v nadaljnjem besedilu: EHD) ter pri drobnici še okužbe z virusom kuge drobnice (v nadaljnjem besedilu: PPR).
 5. Uradni laboratorij na prejetih vzorcih iz 1. in 2. točke te priloge opravi:
 - a) preiskave na prisotnost specifičnih protiteles proti BTV na vzorcu krvi iz serološke epruvete;
 - b) preiskave na prisotnost virusa BTV, SIP, EHD in PPR na vzorcih iz druge in tretje alineje 1. točke ter na vzorcih iz 2. točke.
 6. Če je rezultat preiskave na prisotnost virusa BTV pozitiven, je treba opraviti še genotipizacijo za določitev serotipa virusa.
-